

# Tecamin Raiz

## BIOSTIMULANT PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT RRËNJOR



Pleh i lëngshëm për trajtime nga toka

Përmbajtja: 1 L

Importues dhe distributor:



LILA SH.P.K.  
SYZEZE – BERAT – ALBANIA  
Tel: +355 (0) 682047296  
e-mail: lila\_beqar@yahoo.com

Manufacturer:

Agritecno Fertilizantes, S.L.

Plza. Alcalde Domingo Torres 3-1 - 46020 Valencia España.

Tel: + 34 963 391 184 Fax: + 34 963 269 823 - e-mail: info@agritecnofertilizantes.com



www.agritecnofertilizantes.com

TECAMIN RAIZ është ekstrakt bimor që përmban L-amino acide, peptide, proteina, vitamina, enzima, polisaharide, fitohormone natyrale (auksina, citokinina, gibberelina), acide organike dhe biostimulantë të sistemit rrënjor.

- BIOSTIMULANT PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT RRËMJOR
- PËRMIRËSON AFTËSINË MBIRËSË
- PËRMIRËSON QËNDRUSHMËRINË E BIMËVE
- NXIT ZHVILLIMIN E RRËNJËZAVE DHE TË QIMEVE THIOHËSË
- PËRMBAN MIKROELEMENTË USHQYES NE GJENDJE ZHELI

### PËRMBAJTJA E GARANTUAR

L-Amino acids	4,7 % w/w
Total Organic Matter	22 % w/w
Total Nitrogen (N)	5,5 % w/w
Total Potassium (K <sub>2</sub> O)	1,0 % w/w
Hekur (Fe – HEDTA)	0,5 % w/w
Mangan (Mn)	0,3 % w/w
Zink (Zn)	0,15 % w/w
Bakër (Cu)	0,05 % w/w
Bor (B)	0,05 % w/w
Ekstrakt algash	4,0 % w/w
pH	4,4

### PAJTUESHMËRIA

Përzihet me shumicën e preparateve të zakonshme me përjashtim të atyre që përmbajnë sulfur, bakër dhe vajra minerale. Rekomandohet kryerja e provës së pajtueshmërisë para përdorimit Pas tretjes në ujë të përdoret dhe jo të magazinohet.

### RUAJTJA

Ruajeni në vende të freskëta dhe të hijezuara. Ruajeni larg fëmijëve.

Ruajeni larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve të blegtorisë. Para përdorimit lexoni me kujdes etiketën..

### TUNDNI MIRË PREPARATIN PARRA PËRDORIMIT

Date of manufacture:

Expiry date:

Batch number:

TECAMIN RAIZ rekomandohet për tu përdorur në të gjitha kulturat bujqësore: perime, pemë frutore, bimët e arave, agrume, ulli, hardhi, bimët zbukuruese...

### UDHËZIME PËR PËRDORIMIN

**TRAJTIME NGA TOKA.** Që të thithet sa më mire **TECAMIN RAIZ** duhet të vendoset në shtresën e tokës ku ndodhet sistemi rrënjor. Përdoret si plotësues në të gjitha programet e plehrimeve. Mund të përdoret nëpërmjet ujitjes së fidanave, ujitjes me pika, ose hidroplehrimit. Doza e përdorimit varet nga tipi i tokës dhe nga kultura bujqësore.

Filloni trajtimet me **TECAMIN RAIZ** që në mbjelljen e farës dhe vazhdoni deri në mbjelljen e fidanit në vendin e përhershëm me qellim nxitjen dhe favorizimin e zhvillimit të sistemit rrënjor. Në fazat e mëvonshme përdorni **TECAMIN RAIZ** për të përballuar dëmet e shkaktuara nga përmbytjet, thatësia, kripërat, sëmundjet etj.

KULTURAT BUJQËSORE	KOHA E TRAJTIMIT	DOZA
<b>Hardhia</b>	Farishte - Fidanishte: Tajtoni ditën e 10 ose 15 pas trapiantimit, përsëritni trajtimet çdo 15-21 ditë, deri në 50-60 ditë para rënies së gjetheve.	2-3 mL/ujë ose 3 L/Ha
<b>Ulliri</b>	Fidanishte: Filloni trajtimet 7 ditë pas mbjelljes dhe i përsëritni ato çdo 7 ditë. Gjatë mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Përsëritni trajtimet çdo 10-15 ditë pas mbjelljes në vendin e përhershëm.	2-3 mL/ujë 6-8 ml/rrënjë 3-4 L/Ha
<b>Perimet Frutore</b> (doma, patlixhani, speci, trangulli, kungulli, fasulla, bizelja etj.) <b>Shalqini</b> <b>Pjepri</b> <b>Perimet Bulbore dhe Tuberore</b> (qepa, hudhra, preshi, karota etj.) <b>Lakra, Lule lakra, Lakra brokol etj.</b> <b>Perimet Gjethore</b> (sallata, spinaqi, selino, endivia, etj.)	Farishte - Fidanishte: Filloni trajtimet 3-5 ditë pas mbjelljes dhe i përsëritni ato çdo 7 ditë. Gjatë trapiantimit ujitni fidanat ose zhytni sistemit rrënjor në tretësirën përkatëse. Mund të kombinohet me insekticide ose fungicide. Përsëritni trajtimet çdo 10-15 ditë pas mbjelljes në vendin e përhershëm.	2-3 mL/ujë 10 mL/ujë 3 L/Ha
<b>Pemët frutore</b> (molla, dardha, pjeshka, kumbulla, kajsia etj.) <b>Agrumet</b> (portokalli, limoni, mandarina, qitro etj.)	Farishte - Fidanishte: Filloni trajtimet 7 ditë pas mbjelljes dhe i përsëritni ato çdo 7 ditë. Gjatë mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Përsëritni trajtimet çdo 10-15 ditë pas mbjelljes në vendin e përhershëm.	2-3 mL/ujë 6-8 ml/rrënjë 3-4 L/Ha
<b>Bimët zbukuruese</b> <b>Lulet</b>	Farishte - Fidanishte: Filloni trajtimet që me mbjelljen dhe i përsëritni ato çdo 7 ditë. Gjatë mbjelljes në vendin e përhershëm ujitni fidanat ose zhytni sistemit rrënjor në tretësirën përkatëse. Mund të kombinohet me insekticide ose fungicide. Përsëritni trajtimet pas çdo prerje lulesh.	2-3 mL/ujë 5 mL/ujë 3 L/Ha
<b>Patatja</b>	Trajtoni 10 – 15 ditë pas mbjelljes.	3 L/Ha
<b>Duhani</b>	Gjatë mbjelljes në vendin e përhershëm ujitni fidanat ose zhytni sistemit rrënjor në tretësirën përkatëse	10 mL/ujë